






16 Hautschutzplan

Stand: Dezember 2007

| Hautgefährdung durch: |  Hautschutz |  Hautreinigung |  Hautpflege |  Händedesinfektion |  Handschuhe |
|---|---|--|---|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • vor Arbeitsbeginn • nach Pausen • zwischendurch | <ul style="list-style-type: none"> • vor Pausen • nach der Arbeit • nach sichtbarer Verschmutzung | <ul style="list-style-type: none"> • nach Arbeitsende • nach Hautreinigung • bei Bedarf, bzw. morgens und abends | <ul style="list-style-type: none"> • vor und nach Patientenkontakt • nach Kontakt mit kontaminiertem Material | <p>Unsterile Einmalhandschuhe z.B. bei</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blutentnahmen • vor Kontakt mit infektiösem Material <p>Sterile Einmalhandschuhe z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> • bei invasiven Maßnahmen • bei Verbandwechsel <p>Haushandhandschuhe z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> • beim Umgang mit Lösungen • bei Reinigungsarbeiten |
| Wassermischbare Arbeitsstoffe, z.B. <ul style="list-style-type: none"> • Desinfektionsmittel • Reinigungsmittel | Produktname Handcreme ggf. Handschuhe | Produktname Waschlotion | Produktname Handcreme | | |
| Nichtwassermischbare Arbeitsstoffe, z.B. <ul style="list-style-type: none"> • Massageöle • Waschbenzin | Produktname Handcreme ggf. Handschuhe | Produktname Waschlotion | Produktname Handcreme | | |
| Feuchtigkeitsstau und Mazeration, z.B. <ul style="list-style-type: none"> • beim Tragen von Handschuhen | Produktname Handcreme ggf. Handschuhe | Produktname Waschlotion | Produktname Handcreme | | |
| Nichtphysiologische Besiedlung der Haut, z.B. <ul style="list-style-type: none"> • Bakterien • Pilze • Viren | | | | Produktname Händedesinfektionsmittel | |

Grundlagen sind





Gefahrstoffverordnung und BGR 197 der Berufsgenossenschaften.







Der Einsatz von Schutzhandschuhen gemäß Betriebsanweisung nach 4.1.3.1 UVV und BGR 206 ist zu beachten.




Hautschutz soll ein Eindringen von Schadstoffen in die Haut möglichst gut verhindern und die Hautreinigung erleichtern

17 Reinigungs- und Desinfektionsplan

Stand: Dezember 2007

| Wann? | Wann? | Wie? | Womit? | Wer? |
|--|--|--|--|--|
|  <p>Hygienische Händedesinfektion</p> | <ul style="list-style-type: none"> • vor Arbeitsbeginn; • vor invasiven Maßnahmen; • zwischen Umgang mit verschiedenen Patienten; • nach Kontakt mit kontaminiertem Material; • nach dem Ablegen von Schutzhandschuhen; • bei Bedarf | <p>Die Händedesinfektion ist die einfachste, sicherste und billigste Methode zur Verhütung von Kreuzinfektionen.</p> <p>Konzentrat 30 Sek. lang in die trockenen Hände einreiben. Die Hände müssen während der gesamten Einwirkzeit durch das konzentrierte Präparat feucht gehalten werden.</p> | <p>PRÄPARATENAMEN VAH-gelistet Konzentration Einwirkzeit</p> | <p>Heilpraktiker, Medizinisches Personal</p> |
|  <p>Händewaschung</p> | <ul style="list-style-type: none"> • nach Verschmutzung; • nach Toilettenbesuch; • vor Pausen, • bei Bedarf | <p>Flüssigseife aus Wandspender auf die befeuchteten Hände geben. Nach dem Waschen Hände gründlich abspülen. Mit Einmal-Handtüchern abtrocknen.</p> | <p>PRODUKTNAME Waschlotion</p> | <p>Heilpraktiker, Medizinisches Personal</p> |
|  <p>Haut- und Händepflege</p> | <ul style="list-style-type: none"> • mehrmals täglich; • bei Bedarf | <p>Entnahme aus Spender-Flasche. In die Haut einmassieren.</p> | <p>PRÄPARATENAMEN</p> | <p>Heilpraktiker, Medizinisches Personal</p> |
|  <p>Hautdesinfektion</p> | <ul style="list-style-type: none"> • vor Blutentnahmen; • vor Injektionen; • Akupunktur | <p>Präparat aufsprühen, mit sterilem Tupfer abreiben, nochmals aufsprühen, Einwirkzeit einhalten (Haut trocknen lassen).</p> | <p>PRÄPARATENAMEN VAH-gelistet Konzentration Einwirkzeit.</p> | <p>Heilpraktiker, Medizinisches Personal</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • vor Baunscheidt-Therapie, • vor blutigem Schröpfen ; | <p>Präparat aufsprühen, mit sterilem Tupfer abreiben, nochmals aufsprühen, Einwirkzeit einhalten (Haut trocknen lassen).</p> | <p>PRÄPARATENAMEN <u>Einwirkzeit:</u> talgdrüsenarme Haut: 1 Minute talgdrüsenreiche Haut: 10 Minuten</p> | |

| Wann? | Wann? | Wie? | Womit? | Wer? |
|--|--|---|--|------------------------|
|  Instrumente | <ul style="list-style-type: none"> • sofort nach Gebrauch | <p>Manuelle Aufbereitung: Instrumente in geöffnetem Zustand in Lösung einlegen. Nach Ende der Einwirkzeit Instrumente der Wanne entnehmen, evtl. Bürstenreinigung, mit Wasser abspülen und trocknen.</p> | PRÄPARATENAMEN VAH-gelistet Konzentration Einwirkzeit | Medizinisches Personal |
|  <ul style="list-style-type: none"> ▪ RR-Gerät ▪ Stethoskop ▪ Staubband ▪ Thermometer | <ul style="list-style-type: none"> • nach Benutzung | Desinfizierend abwischen. | PRÄPARATENAMEN VAH-gelistet Konzentration Einwirkzeit | Medizinisches Personal |
|  Medizinische Geräte | <ul style="list-style-type: none"> • täglich; • nach Gebrauch | Desinfizierend abwischen. Dabei darf keine Flüssigkeit in das Geräteinnere eindringen. Vorsicht bei stromführenden Teilen. Netzstecker ziehen. Herstellerangaben beachten. | PRÄPARATENAMEN VAH-gelistet Konzentration Einwirkzeit | Medizinisches Personal |
|  Mobiles Inventar <ul style="list-style-type: none"> ▪ Behandlungsliegen ▪ Infusionsständer | <ul style="list-style-type: none"> • 1 x täglich • nach Gebrauch • bei Bedarf | Desinfizierend abwischen bzw. auswischen. | PRÄPARATENAMEN VAH-gelistet Konzentration Einwirkzeit | Medizinisches Personal |
|  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Flächen ▪ Arbeitsflächen | <ul style="list-style-type: none"> • 1 x täglich • bei Bedarf | Desinfizierend abwischen. Flächen nicht trocken reiben. | PRÄPARATENAMEN VAH-gelistet Konzentration Einwirkzeit | Medizinisches Personal |
|  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Waschbecken ▪ Toiletten | <ul style="list-style-type: none"> • 1 x täglich • bei Bedarf • 1-2 x täglich | <ul style="list-style-type: none"> • Desinfizierend abwischen. Kalkablagerungen an den Armaturen mit Essigreiniger entfernen. Perlatoren 1 x monatlich entfernen und in Essigreiniger einlegen. • Brille, Deckel und Armatur – Feucht-Wisch-Methode.. | PRÄPARATENAMEN Konzentration Einwirkzeit | Reinigungspersonal |

| Wann? | Wann? | Wie? | Womit? | Wer? |
|---|--|---|---|--------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> Abfallbehälter | <ul style="list-style-type: none"> 1 x täglich | <ul style="list-style-type: none"> Abfallbehälter leeren. Desinfizierend abwischen. Neue Abfalltüte einlegen | PRÄPARATENAMEN VAH-gelistet Konzentration Einwirkzeit | Reinigungspersonal |
|  <ul style="list-style-type: none"> Reinigungsutensilien Aufbereitung | <ul style="list-style-type: none"> nach Benutzung | <ul style="list-style-type: none"> Mops/Lappen nach Gebrauch der Aufbereitung in der Waschmaschine zuführen. Waschprogramm: > 60°C bzw. 95°C (Haushaltswaschmittel, Hygienespüler). | NAME VAH-gelistet Hygienespüler | Reinigungspersonal |
|  <ul style="list-style-type: none"> Fußböden | <ul style="list-style-type: none"> 1 x täglich bei Bedarf | <ul style="list-style-type: none"> Feucht-Wisch-Methode | PRÄPARATENAMEN VAH-gelistet Konzentration Einwirkzeit | Reinigungspersonal |

Es kommen nur VAH- oder RKI-gelistete Desinfektionsmittel zum Einsatz.
Die verschiedenen Wirkungsbereiche sind durch Buchstaben gekennzeichnet.

- A** Präparate zur Abtötung von Bakterien, Pilzen oder Pilzsporen
- B** Präparate zur Inaktivierung von Pilzen
- C** Präparate zur Abtötung von Milzbrand-Sporen
- D** Präparate zur Abtötung von Gasödem- und Wundstarrkrampf-Sporen